

栃労基発1029第2号
令和元年10月29日

関係団体代表者 各位

栃木労働局労働基準部長



ヒアリへの対応について（再度の注意喚起）

労働基準行政の推進につきましては、日頃から格別の御理解・御協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。

さて、標記につきましては、別添のとおり、平成29年7月28日付け基安労
発0728第2号（以下「第2号通達」という。）において、特段の御配慮を賜
るようお願いしたところです。

このような中、令和元年10月21日、首相官邸においてヒアリ対策関係閣僚
会議が開催され、東京青海ふ頭において、50個体以上の女王アリが発見される
など、これまでの事例とは次元の異なる事態の発生が確認されたことを踏まえ、
環境省を中心とする関係省庁に対して、我が国へのヒアリ定着阻止のために、政
府一丸となって取り組むよう指示がありました。

つきましては、貴団体におかれましても、第2号通達のとおり、ヒアリの特徴、
生態、駆除方法、刺された時の対処方法等についてまとめられている環境省ホー
ムページを参照の上、本件に関し会員や関係事業場に対する周知及び指導を行
っていただくとともに、当該事業場が対策を実施される際には、特段の御配慮を
賜りますようお願いいたします。

○環境省ホームページ

<http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/fireant.html>



基安労発 0728 第2号
平成29年7月28日

別添関係団体の長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長

ヒアリへの対応について（注意喚起）

労働衛生行政の運営につきましては、日頃から格別の御理解・御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成29年5月に兵庫県尼崎市において「ヒアリ」が発見され、その後全国各地で発見が相次いでいます。ヒアリに刺された場合、疼痛^{とうつう}、搔痒感^{さきょうかん}、水疱^{すいほう}等の症状が生じ、場合によってはアナフィラキシー症状が生じることもあることから、適切な対処が必要となります。

つきましては、貴団体におかれましても、ヒアリの特徴、生態、駆除方法、刺された時の対処方法等についてまとめられている環境省ホームページを参照の上、本件に関し会員や関係事業場に対する周知及び指導を行っていただくとともに、当該事業場が対策を実施される際には、特段の御配慮を賜りますようお願いいたします。

○環境省ホームページ

<http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/fireant.html>

日本の外来種対策 > 外来種問題を考える > 注目の外来種 > 特定外来生物ヒアリに関する情報TOP

特定外来生物ヒアリに関する情報



▼ TOP

▼ ヒアリの基礎情報

▼ 地方公共団体のみなさま

▼ 事業者のみなさま

ヒアリについて ごぞんじですか？

ヒアリに関して、皆様から多くのご关心をお寄せいただいています。

このページはヒアリに関する参考資料をまとめています。

環境省 ヒアリ相談ダイヤル

0570-046-110

【IP電話の場合】06-7634-7300 (一般電話)

受付時間 AM9:00 ~ PM5:00
(12/29~1/3は除く)

ダイヤルイン

※通話料は発信者の負担となります。

※万一、刺されたときは、症状がある場合はお近くの病院にご相談下さい。

■ コンテンツの紹介

特定外来生物ヒアリに関する情報



- ▼ TOP
- ▼ ヒアリの基礎情報
- ▼ 地方公共団体のみなさま
- ▼ 事業者のみなさま

ヒアリの基礎情報

ヒアリって、どんなアリ？ | どうして、ヒアリが日本に？ | ヒアリが定着する…？ | もし、ヒアリに刺されたら？

■ ヒアリって、どんなアリ？

外来生物法により特定外来生物※に指定されています。

ヒアリの特徴

和名	ヒアリ(別名アカヒアリ)
英名	Red Imported Fire Ant
学名	<i>Solenopsis invicta</i>



働きアリ
体長2.5~6mm程度



一番数が多く、刺すアリです。

女王アリ
体長7~8mm程度



羽化した時には翅がありますが、交尾後には翅を落とします。

雄アリ
体長5~6mm程度



羽化した時には翅がありますが、交尾後には翅を落とします。

ヒアリの仲間

和名	アカミミアリ
英名	Tropical Fire Ant
学名	<i>Solenopsis geminata</i>

ヒアリとよく似たアリにアカカミアリがいます。
ヒアリほど毒は強くありません。
せんが、アカカミアリも特定外来生物※に指定されていて、注意が必要なアリです。



※特定外来生物とは？

外来生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすものや、及ぼすおそれがあるもののなかから外来生物法に基づき国が指定した生物。飼養・運搬・保管・輸入・譲渡・放出品等が規制されています。

間違えやすい種類

第1位 キイロシリアゲアリの女王



9月頃、オレンジ色の女王アリが巣つくりのため外に出できます。目につきやすいので、「ヒアリではないか？」との問い合わせの多いアリです。
ヒアリ女王とキイロシリアゲアリ女王の星分け五

ヒアリって、どんなアリ？ | どうして、ヒアリが日本に？ | ヒアリが定着する…？ | もしヒアリに刺されたら？

■ どうして、ヒアリが日本に？

2017年6月、

日本でヒアリが初めて確認されました。ヒアリは、本来、南米中部に生息するアリです。

しかし、船や飛行機に積まれたコントナや貨物にまぎれ込んで、1940年代頃からアメリカ合衆国やカリブ諸島に次々と侵入し、2000年代には原産地から遠く離れたオーストラリア、ニュージーランド、中國、台湾でも発見されるようになります。

日本へも、同じような経路で海外からやってきています。

国内では、次のような場所で確認されています

1 國際貨物が到着する港、空港、コンテナや貨物の中
その他の例
海外製品の箱の中

1 國際貨物が到着する港、空港、コンテナや貨物の中

その他の例
海外製品の箱の中

2 港から陸送されて倉庫に運びこまれた荷物の中

いつたん繁殖してしまうと、根絶はきわめて困難です！

ヒアリが定着した国々では、莫大な費用をかけて駆除を行っていますが、ニュージーランドは、定着初期に徹底した対処を行つたため、唯一根絶に成功しています。また、根絶後も再び侵入定着しないよう警戒を続けています。日本では、国が関係機関に連携して主要港湾等で定期的に侵入状況の調査を実施し、発見された際には緊急駆除ヒモニタリング（継続的な監視調査）を行っています。侵入を減らし、定着を阻止することが大切です。

ヒアリって、どんなアリ？ | どうして、ヒアリが日本に？ | ヒアリが定着すると…？ | もし、ヒアリに刺されたら？

■ ヒアリが定着すると…？

■ 海外では、こんな場所に巣を作っています


ヒアリが好む巣作り場所

ヒアリは、日当たりの良い開放的な場所を好みで巣をつくります。原産地や定着国では以下のような場所で見られます。



ヒアリの巣「アリ塚」

ヒアリは、大きな「アリ塚」をつくります。アリ塚は地中で深くひろがっていて、放射状に地下トンネルが十数メートル先まで伸びています。迷宮状にたくさんのお部屋があり、女王アリと数千から数十万匹もの働きアリが集団で生活しています。




初期のアリ塚

やや発達したアリ塚

注意!

アリ塚が大きく目立つようになるまでには2～3年かかります。その間に、ヒアリはどんどん増えたり塩がつたりして、時間が経つほど根絶することは難しくなります。大きなアリ塚を目印にヒアリを見つけようと/orするのではなく、そろなる前に発見して駆除することが大切です。

◆生活への影響



お花見やピクニック、BBQ、花火大会など、公園や河川敷でのレジャーを安心して楽しむことができなくなるかもしれません。ガーデニング、家庭菜園にも支障が出ます。

◆農業被害・産業への影響



農作物をかじつて品質や収量を低下させたり、家畜を襲ったりします。また農作業をする人が頻繁に刺されるため、海外では耕作放棄や離農者が増えるなどの影響が出ています。輸入された商品などにヒアリが混入すると、物流にも大きな支障が出ます。

◆生態系被害



日本の在来アリを駆逐したり、小動物を捕食して減少させ、生態系のバランスを壊しま�니다。海外では希少種にも影響が出ています。

■定着すると、私たちの暮らしにもさまざまな影響があります！

◆人やペットへの健康被害



刺される
と強い
痛みが
生じ、体
質等に
よっては
強いア
レル
ギー反応(アナフィラキシーショック)を
起こすことがあります。犬や猫など
のペットも、刺されると人と同様に、
重い症状を起こすことがあります。

■もし、ヒアリに刺されたら？

ヒアリって、どんなアリ？ | どうして、ヒアリが日本に？ | ヒアリが定着する…？ | もし、ヒアリに刺されたら？

ヒアリやアカカミアリの毒への反応は人によって大きく異なります。体調に変化がなくても、20～30分程度は刺された部位を冷たいタオルや保冷剤などで冷やしながら安静にし、様子をみて下さい。その間、なるべく一人にならないようにします。

全ての人があらわれる症状

焼けるような痛み、かゆみ、腫(うみ)

刺された瞬間に、熱いと感じるような、激しい痛みを感じます。そして刺された部位に小さな赤みが出てきて、翌日には赤みの中央に腫がたたまつたようになります。軽いかゆみが出ることもありますが、その後は皮膚症状が徐々に改善していきます。

ヒアリ類の毒にアレギー体質を持っている人に起こる症状

じんましん

刺された直後から刺された部分を中心にはみや腫れが起り、かゆくなります。時には全身にかゆみをともなう赤みやミミズ腫れ(じんましん)が現れることがあります。じんましんが出たり、体調不良などの異常を感じた場合は、すぐに医療機関(病院)を受診してください。

呼吸困難・血圧低下・意識障害など

刺され20～30分以内に、息苦しさ、声がれ、激しい動悸やめまい、腹痛などを起こすことがあります。このことから、進行すると血圧が低下して意識を失うこともあります。このような症状が現れた場合には、強いアレルギー反応による「アナフィラキシーショック」の可能性が高く、処置が遅れると生命の危険を伴いますので、救急車を呼ぶ必要があります。

「アリに刺されたこと」「アナフィラキシーショックの可能性があることを伝え、すぐに治療してもらってください。刺したアリの死骸を持参すると、診断に役立ちます。※ヒアリの毒には、ハチ毒との共通成分も含まれるため、ハチ毒アレルギーを持つ方は特に注意が必要です。

ヒアリって、どんなアリ? | どうして、ヒアリが日本に? | ヒアリが定着する…? | もしヒアリに刺されたら?

アリのヒアリ相談チャットボット

ヒアリについてお答えします

